

# Arbeitsmedizinische Präparate

## Ibuprofen OPT® 400 mg

Arzneimittel zur Beseitigung von Schmerzen unterschiedlicher Ursache

**Wirkstoff:** Ibuprofen 400 mg



**Situation:** Schmerzen unterschiedlichster Genese wirken sich nicht nur auf das allgemeine Wohlbefinden des arbeitenden Menschen aus, sie hemmen auch die Leistung und Konzentration am Arbeitsplatz. Damit wächst die Gefahr der Arbeitsunfälle. Schmerz bewirkt dauernde Anspannung und Verkrampfung, so dass die physiologisch notwendige Erholung eingeschränkt werden kann.

**Anwendungsgebiete:** leichte bis mäßig starke Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen und Regelschmerzen sowie Fieber

**Zusammensetzung:** *Wirksamer Bestandteil:* 1 Filmtablette enthält 400 mg Ibuprofen  
*Sonstige Bestandteile:* Mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Hypromellose, Macrogol 400, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Maisstärke, hochdisperses Siliciumdioxid, Stearinsäure, Talkum, Titandioxid

**Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Ibuprofen oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels; Asthmaanfälle, Nasenschleimhautschwellungen, Hautreaktionen nach der Einnahme von nicht-steroidalen Entzündungshemmern; ungeklärte Blutbildungsstörungen; Magen/Zwölffingerdarm-Geschwüre oder Blutungen; Hirnblutungen oder andere aktive Blutungen; Leber- oder Nierenfunktionsstörungen; schwere Herzschwäche; letztes Drittel der Schwangerschaft; Kindern unter 20 kg (6 Jahren)

**Nebenwirkungen:** Magen/Zwölffingerdarm-Geschwüre, Perforationen oder Blutungen; insbesondere bei älteren Patienten Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Blähungen, Verstopfung, Verdauungsbeschwerden, abdominale Schmerzen, Teerstuhl, Bluterbrechen, ulzerative Stomatitis, Verschlimmerung von Colitis und Morbus Crohn; Magenschleimhautentzündung; Magen-Darm-Blutungen in Abhängigkeit vom Dosisbereich und der Anwendungsdauer. Ödeme, Bluthochdruck und Herzinsuffizienz im Zusammenhang mit NSAR-Behandlung

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** siehe Packungsbeilage.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Einnahme ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat nicht länger als 4 Tage.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Körpergewicht (Alter)	Einzeldosis	max. Tagesdosis
20 kg – 29 kg (6 - 9 Jahre)	½ Filmtablette (entsprechend 200 mg Ibuprofen)	1 ½ Filmtabletten (entsprechend bis 600 mg Ibuprofen)
30 kg – 39 kg (10 – 12 Jahre)	½ Filmtablette (entsprechend 200 mg Ibuprofen)	2 Filmtabletten (entsprechend 800 mg Ibuprofen)
> 40 kg (Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene)	½ - 1 Filmtablette (entsprechend 200 – 400 mg Ibuprofen)	3 Filmtabletten (entsprechend 1200 mg Ibuprofen)

Wenn Sie die maximale Einzeldosis eingenommen haben, warten Sie mindestens 6 Stunden bis zur nächsten Einnahme.  
Nehmen Sie die Filmtabletten bitte unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit (z. B. einem Glas Wasser) während oder nach einer Mahlzeit ein.

**Packungsgrößen:** 500 Tabletten (PZN 5986773), 1.000 Tabletten (PZN 5986796)

**Zul.-Nr.:** 2129.97.99

**Apothekenpflichtig!** Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**Pharmazeutischer Unternehmer:** OPTIMED Pharma GmbH, 50226 Frechen

**Vertrieb im arbeitsmedizinischen Bereich:** foliapharm GmbH, 50226 Frechen

**Hinweis:** Dieses Produktblatt ersetzt nicht die Gebrauchsinformation!

**Packungsbeilage beachten!**



ATEMWEGERKRANKUNGEN



SCHMERZEN



VERLETZUNGEN



MYKOSEN + HAUTSCHUTZ



OPHTHALMIKA + AUGEN



NAHRUNGSERGÄNZUNG



MAGEN + DARM

Stand dieser Information: November 2007  
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!  
V112007

foliapharm GmbH  
Alfred-Nobel-Str. 5  
D - 50226 Frechen

Fon 02234-95549 0  
Fax 02234-95549 50  
eMail info@foliapharm.de  
Web www.foliapharm.de

 **foliapharm**  
Gesund arbeiten!